



Schemat dawkowania w DME



- ✓ **Iniekcje co 4 tygodnie** w przypadku pierwszych **4 dawek**.
- ✓ Następnie leczenie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb z zastosowaniem podejścia „**treat-and-extend**”. W zależności od oceny parametrów anatomicznych i (lub) wyników leczenia dotyczących wzroku dokonanej przez lekarza, odstęp pomiędzy dawkami można wydłużać **do 16 tygodni (4 miesięcy)**, zwiększając go **jednorazowo o maksymalnie 4 tygodnie**.
- ✓ Jeśli parametry anatomiczne i (lub) wyniki leczenia dotyczące wzroku ulegną zmianie, należy odpowiednio dostosować odstęp w leczeniu, a w przypadku pogorszenia parametrów anatomicznych i (lub) wyników leczenia dotyczących wzroku należy skrócić odstępy pomiędzy podaniem leku.
- ✓ **Nie** badano odstępów pomiędzy wstrzyknięciami **krótszych niż 4 tygodnie**.

Schemat dawkowania w nAMD



- ✓ **Iniekcje co 4 tygodnie** w przypadku pierwszych **4 dawek**.
- ✓ Następnie zaleca się dokonanie oceny aktywności choroby w oparciu o parametry anatomiczne i (lub) wyniki leczenia dotyczące wzroku **po 20 i (lub) 24 tygodniach** od rozpoczęcia leczenia, tak by umożliwić dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb.
- ✓ U pacjentów bez aktywności choroby należy rozważyć podawanie farycymabu co **16 tygodni (4 miesiące)**.
- ✓ U pacjentów z aktywnością choroby należy rozważyć leczenie co **8 tygodni (2 miesiące)** lub co **12 tygodni (3 miesiące)**.
- ✓ Istnieją **ograniczone dane** dotyczące bezpieczeństwa leczenia w przypadku odstępów między wstrzyknięciami wynoszących **8 tygodni lub mniej**.

DME | nAMD



Wizyty w celu monitorowania stanu pacjenta pomiędzy podaniem dawki leku należy wyznaczać w zależności od stanu pacjenta i według uznania lekarza, nie ma jednak wymogu przeprowadzania comiesięcznych wizyt monitorujących.

*Minimum 8 tyg.
M – miesiąc, T – tydzień

Legenda:
■ Iniekcja ■ Wizyta kontrolna